

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α

Α1.α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελ 15.

Έστω A ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Ονομάζουμε **πραγματική συνάρτηση** με **πεδίο ορισμού το A** μια διαδικασία (κανόνα) f , με την οποία κάθε στοιχείο $x \in A$ αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό y . Το y ονομάζεται **τιμή της f στο x** και συμβολίζεται με $f(x)$.

β) Έστω μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι 1-1, τότε έχει αντίστροφη. (σελ 35 σχολικό βιβλίο)

γ) Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου τότε για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών, $f(A)$, της f υπάρχει μοναδικό στοιχείο x του πεδίου ορισμού της A για το οποίο ισχύει $f(x) = y$. Επομένως ορίζεται μια συνάρτηση $g: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$ με την οποία κάθε $y \in f(A)$ αντιστοιχίζεται στο μοναδικό $x \in A$ για το οποίο ισχύει $f(x) = y$.

Από τον τρόπο που ορίστηκε η g προκύπτει ότι:

- έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών $f(A)$ της f ,
- έχει σύνολο τιμών το πεδίο ορισμού A της f και
- ισχύει η ισοδυναμία: $f(x) = y \Leftrightarrow g(y) = x$.

Αυτό σημαίνει ότι, αν η f αντιστοιχίζει το x στο y , τότε η g αντιστοιχίζει το y στο x και αντιστρόφως. Δηλαδή η g είναι η αντίστροφη διαδικασία της f . Για το λόγο αυτό η g λέγεται **αντίστροφη συνάρτηση** της f και συμβολίζεται με f^{-1} . Επομένως έχουμε $f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$ οπότε $f^{-1}(f(x)) = x$, $x \in A$ και $f(f^{-1}(y)) = y$, $y \in f(A)$.



A2. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε $f'(x_0) = 0$.
(σελ 142 σχολικό βιβλίο)

A3. Αποδεικνύουμε το θεώρημα στην περίπτωση που είναι $f'(x) > 0$.

Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Θα δείξουμε ότι $f(x_1) < f(x_2)$. Πράγματι, στο διάστημα $[x_1, x_2]$ η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, \text{ οπότε έχουμε } f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Επειδή $f'(\xi) > 0$ και $x_2 - x_1 > 0$, έχουμε $f(x_2) - f(x_1) > 0$, οπότε $f(x_1) < f(x_2)$.

A4.α) Ο ισχυρισμός είναι λάθος.

Αιτιολόγηση :

Η γνωστή συνέπεια του θεωρήματος μέσης τιμής καθώς και το πόρισμά του ισχύουν σε διάστημα και όχι σε ένωση διαστημάτων.

Για παράδειγμα, έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$.

Παρατηρούμε ότι, αν και $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, εντούτοις η f δεν είναι σταθερή στο $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. (σελ 134 σχολικό βιβλίο)

β) Ο ισχυρισμός είναι λάθος

Αιτιολόγηση:

Η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 3, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$ δεν είναι συνεχής στο 1, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2, \text{ ενώ } f(1) = 3. \text{ (σελ 71 σχολικό βιβλίο)}$$

A5. Σωστή επιλογή είναι η γ)

ΘΕΜΑ Β

B1. Ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + \lambda) = 2 \Leftrightarrow 0 + \lambda = 2 \Leftrightarrow \lambda = 2$, αφού

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \stackrel{\text{Θέτω } -x=y}{=} \lim_{\text{όποτε } y \rightarrow -\infty} e^y = 0.$$



B2. Θεωρώ τη συνάρτηση g με $g(x) = f(x) - x = e^{-x} - x + 2, x \in [2, 3]$.

Η g συνεχής στο $[2, 3]$ ως πράξη συνεχών συναρτήσεων.

$$\left. \begin{aligned} g(2) &= e^{-2} - 2 + 2 = e^{-2} > 0 \\ g(3) &= e^{-3} - 3 + 2 = \frac{1}{e^3} - 1 = \frac{1 - e^3}{e^3} < 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow g(2) \cdot g(3) < 0$$

Από Θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (2, 3)$ ώστε $g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = 0$.

Επίσης $g'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$ για κάθε $x \in [2, 3]$. Άρα η g γνησίως φθίνουσα,

οπότε η $x = x_0$ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ.

B3. $f'(x) = -e^{-x} < 0$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε είναι και 1-1 και αντιστρέφεται. Για να προσδιορίσουμε την f^{-1} λύνουμε την εξίσωση $y = f(x)$ ως προς x .


$$y = f(x) \Leftrightarrow y = e^{-x} + 2 \Leftrightarrow y - 2 = e^{-x} \Leftrightarrow -x = \ln(y - 2) \Leftrightarrow x = -\ln(y - 2).$$

Άρα $f^{-1}(x) = -\ln(x - 2), x > 2$.

B4. Ελέγχουμε κατακόρυφες ασύμπτωτες:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-\ln(x - 2)) \stackrel{x-2=y}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} (-\ln y) = +\infty.$$

Άρα η $x = 2$ κατακόρυφη ασύμπτωτη της $C_{f^{-1}}$.



Γ1. Αφού η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στους πραγματικούς αριθμούς θα είναι και συνεχής στο πεδίο ορισμού της. Άρα f συνεχής στο $x_0 = 1$.

$$\text{Επομένως } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x), \quad (1)$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 + a$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + \beta$, $f(1) = 1 + \alpha$ λόγω της (1) θα είναι $\alpha = \beta$.

$$\text{Αφού η συνάρτηση } f \text{ είναι παραγωγίσιμη απαιτώ } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (2)$$

$$\text{Είναι } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + a - 1 - a}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} + \beta x - 1 - a}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} + \alpha x - 1 - \alpha}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{e^{x-1} - 1}{x - 1} + \frac{\alpha(x-1)}{x-1} \right) = 1 + \alpha$$

$$\text{αφού } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} - 1}{x - 1} \stackrel{0/0}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1}}{1} = 1.$$

Επομένως η (2) δίνει, $1 + \alpha = 2 \Leftrightarrow \alpha = 1$. Τέλος, αφού $\alpha = \beta$ θα είναι και $\beta = 1$.

Γ2. Αν $x > 1$, τότε $f'(x) = 2x > 0$. Αν $x < 1$, τότε $f'(x) = e^{x-1} + 1 > 0$, $f'(1) = 2$. Ακόμη, η f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$, επομένως είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Για το σύνολο τιμών της συνάρτησης θα ισχύει

$$f(\mathbb{R}) \stackrel{\text{συνεχής}}{=} \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}, \text{ αφού,}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{x-1} + x) \stackrel{x-1=y}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} (e^y + x) = +\infty$$

Γ3.i. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ θα υπάρχει αριθμός $\kappa < 0$, ώστε $f(\kappa) < 0$. $f(0) = e^{-1}$,

και αφού η f είναι συνεχής στο $[\kappa, 0]$ θα ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο παραπάνω διάστημα. Θα υπάρχει ένας τουλάχιστον $x_0 \in (\kappa, 0) \subseteq (-\infty, 0)$ ώστε $f(x_0) = 0$.

Αν τώρα $x > 0$, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα προκύπτει $f(x) > f(0) = 0$. Άρα x_0 μοναδική ρίζα.

$$f(x_1) = x_0 \stackrel{\text{ii, απόρροια}}{\Leftrightarrow} f^2(x_1) - x_0 \cdot f(x_1) = 0 \quad (1)$$

Έστω ότι υπάρχει ρίζα $x_1 \in (x_0, +\infty)$ της (1) τότε $f^2(x_1) - x_0 \cdot f(x_1) = 0 \Leftrightarrow f(x_1) \cdot (f(x_1) - x_0) = 0$.

• $f(x_1) = 0$ ΑΤΟΠΟ, γιατί μοναδική ρίζα της f είναι το x_0 .

• $f(x_1) = x_0 < 0$

$\rightarrow$ Αν $x_1 \in (x_0, 1)$ τότε ()



$$\left. \begin{array}{l} x_1 > x_0 \\ e^{x_1-1} > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow e^{x_1-1} + x_1 > x_0 \text{ ΑΤΟΠΟ.}$$

→ Αν $x_1 \in [1, +\infty)$ τότε $f(x_1) = x_0 \Leftrightarrow x_1^2 + 1 = x_0$. Όμως,

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \geq 1 \Leftrightarrow x_1^2 \geq 1 \Leftrightarrow x_1^2 + 1 \geq 2 \\ x_0 < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ΑΤΟΠΟ.}$$

Άρα η εξίσωση (1) είναι αδύνατη στο $(x_0, +\infty)$.

β τρόπος: $f^2(x) - x_0 \cdot f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) \cdot (f(x) - x_0) = 0$

Άρα $f(x) = 0$ ή $f(x) = x_0$ (1).

Η (1) είναι αδύνατη διότι:

$$\left. \begin{array}{l} \text{αν } x > x_0 \quad \xRightarrow{\text{f γνωσίως αύξουσα}} f(x) > f(x_0) \\ \text{όμως } f(x_0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) > 0 > x_0. \text{ Άρα } f(x) - x_0 > 0.$$


Συνεπώς $f(x) = 0$, η οποία από (Γ3.ι.) έχει μοναδική λύση την $x = x_0 \notin (x_0, +\infty)$.

Άρα η εξίσωση $f^2(x) - x_0 \cdot f(x) = 0$ είναι αδύνατη στο $(x_0, +\infty)$.

Γ4. $E = \frac{OK \cdot MK}{2} = \frac{x(x^2 + 1)}{2} = \frac{1}{2}(x^3 + x)$, αφού $E = E(t)$ τότε $E(t) = \frac{1}{2}((x(t))^3 + x(t))$ άρα

$$E'(t) = \frac{1}{2}((x(t))^3 + x(t))' = \frac{1}{2}(3(x(t))^2 \cdot x'(t) + x'(t)).$$

Την χρονική στιγμή $t = t_0$ ισχύει $E'(t_0) = \frac{1}{2}(3(x(t_0))^2 \cdot x'(t_0) + x'(t_0)) = \frac{1}{2}(6(x(t_0))^2 + 2) = 28 \text{ cm/sec.}$



Δ1. α τρόπος: $f(x) = (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) + \alpha x + \beta$

$$f'(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) + (x-1) \cdot \frac{2x-2}{x^2 - 2x + 2} + \alpha \Leftrightarrow f'(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) + \frac{2(x-1)^2}{x^2 - 2x + 2} + \alpha.$$

Εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(1,1)$: $y - f(1) = f'(1) \cdot (x-1) \Leftrightarrow y - (\alpha + \beta) = \alpha \cdot (x-1) \Leftrightarrow$
 $y = \alpha x - \alpha + \alpha + \beta \Leftrightarrow y = \alpha x + \beta.$

Αφού η $y = -x + 2$ εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(1,1)$ έχουμε $\alpha = -1$ και $\beta = 2$.

β τρόπος: $f(x) = (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) + \alpha x + \beta$

$$f(1) = 1 \Leftrightarrow \alpha + \beta = 1$$

$$f'(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) + (x-1) \cdot \frac{1}{x^2 - 2x + 2} \cdot (2x-2) + \alpha$$

$$f'(1) = -1 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

$$\text{Άρα } \beta = 1 - \alpha = 2.$$

Δ2. $f(x) = (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) - x + 2 \Leftrightarrow f(x) + x - 2 = (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2)$

Για το $x^2 - 2x + 2 = x^2 - 2x + 1 + 1 = (x-1)^2 + 1 \geq 1$. Άρα $\ln(x^2 - 2x + 2) \geq 0$.

Για $1 \leq x \leq 2$ έχουμε $(x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) \geq 0$ με την ισότητα να ισχύει για $x = 1$. Έστω E το

ζητούμενο εμβαδόν. $E = \int_1^2 (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) dx.$

Θέτω $x-1 = y$ οπότε $dx = dy$. Για $x = 1$: $y = 0$ και $x = 2$: $y = 1$.

$$E = \int_0^1 y \cdot \ln(y^2 + 1) dy = \left[\frac{y^2}{2} \cdot \ln(y^2 + 1) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{y^2}{2} \cdot \frac{2y}{y^2 + 1} dy = \frac{1}{2} \cdot \ln 2 - \int_0^1 \frac{y^3}{y^2 + 1} dy =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \ln 2 - \int_0^1 \left(y - \frac{y}{y^2 + 1} \right) dy = \frac{1}{2} \cdot \ln 2 - \int_0^1 y dy + \int_0^1 \frac{y}{y^2 + 1} dy = \frac{1}{2} \cdot \ln 2 - \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \cdot [\ln(y^2 + 1)]_0^1 =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \ln 2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \text{ τ.μ.}$$

Δ3. i. Ισχύει $f'(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) + \frac{2(x-1)^2}{x^2 - 2x + 2} - 1 \geq -1$. Η ισότητα ισχύει για $x = 1$.

ii. α τρόπος: $f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) + \lambda \geq (\lambda - 1) \cdot \ln(\lambda^2 - 2\lambda + 2) + \frac{3}{2} \Leftrightarrow f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) + \lambda \geq f(\lambda) + \lambda - 2 + \frac{3}{2} \Leftrightarrow$

$$f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) \geq f(\lambda) - \frac{1}{2} \Leftrightarrow f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) + \lambda + \frac{1}{2} \geq f(\lambda) + \lambda. \text{ Θεωρώ τη συνάρτηση } k \text{ με}$$

$k(x) = f(x) + x, x \in \mathbb{R}$. Τότε $k'(x) = f'(x) + 1 \stackrel{ii)}{\geq} 0$ και k συνεχής στο $\mathbb{R}$. Άρα η k είναι γνησίως αύξουσα, αφού $\lambda + \frac{1}{2} > \lambda$.

β τρόπος: Η ανισοτική σχέση που ζητείται να αποδειχθεί μπορεί να προκύψει εφαρμόζοντας Θεώρημα μέσης τιμής για τη συνάρτηση f στο $\left[\lambda, \lambda + \frac{1}{2}\right]$.

Δ4. Έστω $(x_A, f(x_A))$ το σημείο επαφής της εφαπτομένης της C_f και $(x_B, g(x_B))$ το σημείο επαφής της εφαπτομένης της C_g . Για να έχουν κοινή εφαπτομένη θα πρέπει $f'(x_A) = g'(x_B)$.

Από **(Δ3. i.)** ισχύει $f'(x_A) \geq -1$ για κάθε $x_A \in \mathbb{R}$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x_A = 1$.

Επιπλέον, η $g'(x_B) = -3x_B^2 - 1 \leq -1$ για κάθε $x_B \in \mathbb{R}$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x_B = 0$.

Άρα $f'(x_A) \geq -1 \geq g'(x_B)$ για κάθε $x_A, x_B \in \mathbb{R}$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x_A = 1$ και $x_B = 0$.

Στο $x_A = 1$ η εφαπτομένη της C_f είναι η $y = -x + 2$ από υπόθεση. Η εφαπτομένη της C_g στο

$x_B = 0$ είναι η $y - g(0) = g'(0) \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y - 2 = -1 \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y = -x + 2$.

Συνεπώς, μοναδική κοινή εφαπτομένη των C_f και C_g είναι η $y = -x + 2$.