

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

15.06.2018

Θέμα Α

A.1 - β

A.2 - β


A.3 - γ

A.4 - δ


A.5 - δ

Θέμα Β

B1.



Το Mg βρίσκεται στην 3^η περίοδο και II_A ομάδα του περιοδικού πίνακα.



Το B βρίσκεται στην 2^η περίοδο και III_A (ή 13) ομάδα του περιοδικού πίνακα.

β) Έστω X ένα στοιχείο που βρίσκεται στη 2^η περίοδο και II_A ομάδα. Η ατομική ακτίνα κατά μήκος μιας περιόδου ελαττώνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, αφού αυξάνεται ο ατομικός αριθμός και συνεπώς το δραστικό πυρηνικό φορτίο, οπότε η έλξη του πυρήνα στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας μεγαλώνει. Το στοιχείο X ανήκει στην ίδια περίοδο με το B αλλά πιο αριστερά, οπότε η ατομική ακτίνα του X είναι μεγαλύτερη από την ατομική ακτίνα του B. Το X ανήκει στην ίδια ομάδα με το Mg αλλά πιο πάνω από αυτό, οπότε η ατομική ακτίνα του Mg είναι μεγαλύτερη από την ατομική ακτίνα του X.







www.ekpaideysh.gr

εκπαίδευση
ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ: ΚΥΨΕΛΗΣ 47 & ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ 11 ☎ 210 8254700 📠 210 8254700
ΑΛΙΜΟΣ: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 47 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) ☎ 210 9824543 📠 210 9824543

Τελικά $r_{Mg} > r_B$

γ)



εκπαίδευση
ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ



Παρατηρούμε ότι η $E_{i3} < E_{i4}$. Για την απομακρυνση του τέταρτου ηλεκτρονίου απαιτήθηκε σημαντικά μεγαλύτερο ποσό ενέργειας, λόγω της σταθερής δομής τους ιόντος X^{3+} . Άρα το στοιχείο X έχει 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα. Άρα το στοιχείο X είναι το B.

δ) Το ηλεκτρόνιο που απομακρύνεται ευκολότερα είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια, συνεπώς είναι αυτό που βρίσκεται στην υποστιβάδα 2p.

ε) Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού έχει μεγαλύτερη τιμή από τη πρώτη, καθώς πιο εύκολα φεύγει το ηλεκτρόνιο από το ουδέτερο άτομο από ότι από ένα θετικά φορτισμένο ιόν. (το κατιόν έχει μικρότερο μέγεθος, άρα και η έλξη πυρήνα – ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας είναι ισχυρότερη)

B2.

α) Η καμπύλη (1) αντιστοιχεί στο υδρογόνο (H_2) και η (2) στο μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

β) Επειδή ο ρυθμός μεταβολής των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων και των προϊόντων είναι ανάλογος με τους αντίστοιχους στοιχειομετρικούς συντελεστές των ουσιών, παρατηρούμε από τις καμπύλες, ότι η μεταβολή της συγκέντρωσης στη καμπύλη 1 είναι διπλάσια από τη μεταβολή της συγκέντρωσης της καμπύλης 2.

γ)

ι) Από το σχήμα παρατηρούμε ότι η τελική συγκέντρωση της μεθανόλης σε θερμοκρασία T_2 είναι μικρότερη από αυτή σε θερμοκρασία T_1 . Συνεπώς η χημική ισορροπία σε θερμοκρασία T_2 είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά. Η αντίδραση παραγωγής μεθανόλης είναι εξώθερμη. Γνωρίζουμε ότι με αύξηση της θερμοκρασίας ευνοούνται οι ενδόθερμες αντιδράσεις, δηλαδή η διάσπαση της μεθανόλης (η αντίδραση προς τα αριστερά). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η θερμοκρασία T_2 θα είναι μεγαλύτερη από την T_1 .



ii) Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης, άρα η χημική ισορροπία αποκαθίσταται σε μικρότερο χρονικό

διάστημα. Αυτό δικαιολογείται από το διάγραμμα όπου φαίνεται ότι η συγκέντρωση της μεθανόλης σταθεροποιείται πιο γρήγορα σε θερμοκρασία T_2 .

Σημείωση:

Η παραπάνω αιτιολόγηση του ii καλύπτει και την απάντηση του i

B3.

α) η κατάλυση είναι ομογενής γιατί ο καταλύτης είναι στην ίδια φάση με το καταλυόμενο σύστημα.



β) Το Σχήμα 3

γ) Η αντίδραση 1 είναι εξώθερμη αφού $\Delta H < 0$. Άρα η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι μεγαλύτερη από την ενθαλπία των προϊόντων. Η αντίδραση 2, πραγματοποιείται με την παρουσία καταλύτη. Ο καταλύτης δημιουργεί μια νέα, συντομότερη πορεία με μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης, γι αυτό και η αντίδραση 2 έχει μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης σε σχέση με την αντίδραση 1.

Θέμα Γ

Γ1

α)





www.ekpaideysh.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ: ΚΥΨΕΛΗΣ 47 & ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ 11 ☎ 210 8254700 📠 210 8254700
ΑΛΙΜΟΣ: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 47 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) ☎ 210 9824543 📠 210 9824543

X H_2O

E $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
 $\parallel$
 O

Θ $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OMgBr} \end{array}$

I $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$


Ψ HCl

Z $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
 $|$
 CN

K $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
 $|$
 COOH


β) Για έλεγχο ακορεστότητας από τα παραπάνω αντιδραστήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάλυμα Br_2 σε CCl_4 .

γ)





Η ένωση E δε δίνει την ιωδοφορμική αντίδραση διότι δεν έχει γενικό τύπο



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ



ε) Οι ασταθείς ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση αυτή είναι:



Τα πιθανά προϊόντα είναι :



Επιλέγουμε μία ένωση από κάθε ζεύγος.

Γ2.

α)

Mol ελαϊκού οξέος : $n_1 = \frac{m}{M_r} = \frac{141}{282} = 0,5 \text{ mol}$

Mol Br: $n_2 = c \cdot V = 1 \cdot 0,8 = 0,8 \text{ mol}$

mol	$C_{18}H_{34}O_2$	+	Br_2	$\rightarrow$	$C_{18}H_{34}O_2Br_2$
αρχ.	0,5		0,8		
αντ./παρ.	0,5		0,5		0,5
Τελικά	-		0,3		0,5

Η M_r του προϊόντος είναι: $M_r = 282 + 160 = 442$. Οπότε η μάζα του προϊόντος υπολογίζεται:

$$m = n \cdot M_r \Rightarrow m = 0,5 \cdot 442 \Rightarrow \boxed{m = 221g}$$

β) Στο διάλυμα Δ περιέχονται 0,3 mol Br_2 . Για να αποχρωματιστεί το διάλυμα Δ πρέπει να αντιδράσουν πλήρως 0,3 mol Br_2 σύμφωνα με την αντίδραση:

mol	C_2H_4	+	Br_2	$\rightarrow$	$C_2H_4Br_2$
αρχ.	n		0,3		
αντ./παρ.	0,3		0,3		0,3
Τελικά	n-0,3		-		0,3

$$n \geq 0,3 \Rightarrow \frac{V}{V_m} \geq 0,3 \Rightarrow \frac{V}{22,4} \geq 0,3 \Rightarrow V \geq 6,72L$$

Οπότε ο ζητούμενος όγκος του C_2H_4 είναι : $V \geq 6,72L$

Θέμα Δ

Δ.1

α.

mol	$C(s) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g)$		
αρχ.	n	n	
αντ./παρ.	x	2x	x
XI	n-x	n-2x	x

Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίζεται με βάση το H_2 που είναι σε έλλειμμα:

$$\alpha = \frac{\text{Πρακτικό Ποσό}}{\text{Θεωρητικό Ποσό}} = \frac{2x}{n} \Rightarrow 0,5 = \frac{2x}{n} \Rightarrow n = 4x \quad (1)$$

Γράφουμε την K_C της ισορροπίας:

$$K_C = \frac{[CH_4]}{[H_2]^2} = \frac{\left(\frac{x}{10}\right)}{\left(\frac{n-4x}{10}\right)^2} \rightarrow 0,1 = \frac{\left(\frac{x}{10}\right)}{\left(\frac{n-4x}{10}\right)^2} \quad (2)$$

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:


$$0,1 = \frac{\left(\frac{x}{10}\right)}{\left(\frac{4x-2x}{10}\right)^2} \rightarrow x = 25 \text{ mol}$$

Τελικά από την (1) προκύπτει:

$$n = 4x = 4 \cdot 25 \Rightarrow n = 100 \text{ mol}$$

Δ.2

α.



β.

i) Το ογκομετρούμενο διάλυμα HCOONa έχει όγκο 20 ml και συγκέντρωση έστω C_β . Στο ισοδύναμο σημείο έχουμε από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης:

$$n_o = n_\beta \Rightarrow c_o V_o = c_\beta V_\beta \Rightarrow 0,2 \cdot 20 = c_\beta \cdot 20 \Rightarrow c_\beta = 0,2\text{M}$$

ii) Στο μέσον της ογκομέτρησης έχουμε

mol	HCOONa	+	HCl	$\rightarrow$	HCOOH	+	NaCl
αρχ.	0,004		0,002				
αντ./παρ.	0,002		0,002		0,002		0,002
Μέσον Ογκομέτρησης	0,002		-		0,002		0,002

Ο όγκος του πρότυπου διαλύματος που έχει προστεθεί ως το μέσον της ογκομέτρησης είναι:

$$V_{\text{ολ.}} = V_{\text{ογκ.}} + V_{\text{Π}} \Rightarrow V_{\text{ολ.}} = 20 + 10 = 30\text{ml} = 0,03\text{L}$$

$$n_o = n_\beta \Rightarrow c_o V_o = c_\beta V_\beta \Rightarrow 0,2 \cdot 20 = c_\beta \cdot 20 \Rightarrow c_\beta = 0,2\text{M}$$



ii) Στο μέσον της ογκομέτρησης έχουμε

mol	HCOONa	+	HCl	→	HCOOH	+	NaCl
αρχ.	0,004		0,002				
αντ./παρ.	0,002		0,002		0,002		0,002
Μέσον Ογκομέτρησης	0,002		-		0,002		0,002

Ο όγκος του πρότυπου διαλύματος που έχει προστεθεί ως το μέσον της ογκομέτρησης είναι:

$$V_{\text{ολ.}} = V_{\text{ογκ.}} + V_{\text{Π}} \Rightarrow V_{\text{ολ.}} = 20 + 10 = 30 \text{ ml} = 0,03 \text{ L}$$

Το τελικό διάλυμα θα είναι ρυθμιστικό με $c_{\text{HCOOH}} = c_o = \frac{0,002}{0,03} \text{ M}$,

$c_{\text{HCOONa}} = c_{\beta} = \frac{0,002}{0,03} \text{ M}$ και NaCl με την ίδια συγκέντρωση που δεν επηρεάζει το

pH του διαλύματος αφού κανένα από το ιόντα στα οποία αυτό διίσταται δεν αντιδρά με το νερό.

Εφόσον ισχύουν οι προσεγγίσεις θα ισχύει και η εξίσωση Henderson-Hasselbach:

$$pH = pK_a + \log \frac{c_{\beta}}{c_o} \Rightarrow pH = pK_a + \log \frac{c_{\beta}}{c_o} \Rightarrow pH = pK_a \Rightarrow \boxed{pK_a = 4} \text{ ή } \boxed{K_a = 10^{-4}}$$

iii) Στο ισοδύναμο σημείο έχουμε:

mol	HCOONa	+	HCl	→	HCOOH	+	NaCl
αρχ.	0,004		0,004				
αντ./παρ.	0,004		0,004		0,004		0,004
Ισοδύναμο σημείο	-		-		0,004		0,004



είναι:

$$V_{\Pi} = 20ml = 0,02L .$$

Έτσι ο ολικός όγκος του ογκομετρούμενου διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο θα είναι:

$$V_{ολ.} = V_{ογκ.} + V_{\Pi} \Rightarrow V_{ολ.} = 20 + 20 = 40ml = 0,04L$$

Το τελικό διάλυμα θα περιέχει $HCOOH$ με $c_{HCOOH} = \frac{0,004}{0,04} = 0,1M$ και $NaCl$ με την ίδια συγκέντρωση που δεν επηρεάζει το pH του διαλύματος αφού κανένα από το ιόντα στα οποία αυτό διίσταται δεν αντιδρά με το νερό.



$$K_a = \frac{\psi^2}{c_{HCOOH}-\psi} \approx \frac{\psi^2}{c_{HCOOH}} \rightarrow \psi = 10^{-2,5} M$$

$$\text{Άρα } pH = 2,5$$

iv) Ο καταλληλότερος δείκτης είναι το κυανούν της θυμόλης διότι η περιοχή αλλαγής χρώματος του (1,7-3,2) περιέχει την τιμή του pH ισοδύναμο σημείο.


v) Στο διάλυμα Δ_1 περιέχονται $n = c \cdot V = 0,2 \cdot 2 = 0,4mol$ $HCOONa$. Αφού το HCN που χρησιμοποιήθηκε ήταν ισομοριακό με την παραπάνω ποσότητα του $HCOONa$ θα ήταν κι αυτό $0,4mol$. Συνεπώς:

$$V_{HCN} = n \cdot V_m \Rightarrow V_{HCN} = 0,4 \cdot 22,4 \Rightarrow V_{HCN} = 8,96L$$




Δ.3

α. Με προσθήκη ποσότητας HCl αυτό ιοντίζεται πλήρως:



Έτσι, πραγματοποιούνται οι παρακάτω αντιδράσεις:



Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ελάττωση των mol του HCOO^- και εφόσον ο όγκος του διαλύματος δεν μεταβάλλεται θα έχουμε και **μείωση της συγκέντρωσης των HCOO^-**

β. Με προσθήκη ποσότητας NaOH θα έχουμε επίδραση κοινού ιόντος διότι το NaOH διίσταται:

$\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ με αποτέλεσμα την αύξηση της $[\text{OH}^-]$ και τη μετατόπιση της χημικής ισορροπίας προς τα αριστερά σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. Έτσι θα αυξηθούν τα mol HCOO^- και εφόσον ο όγκος του διαλύματος δεν μεταβάλλεται θα έχουμε και **αύξηση της συγκέντρωσης των HCOO^-**

γ. Με αύξηση του όγκου του δοχείου η χημική ισορροπία δεν επηρεάζεται αφού δεν μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των ουσιών που συμμετέχουν στην ισορροπία. (Δεν μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος).